Quel est votre diagnostic ?

Quel est votre diagnostic
microscopique ?

1

- a) Urate *UNa*
- b) Pyrophosphate de calcium *PPC*
- c) Cholesterol *C*
- d) Phospholipides *PL*
- e) Bétaméthasone *BM*

2

- a) Urate *UNa*
- b) Pyrophosphate de calcium *PPC*
- c) Cholestérol *C*
- d) Phospholipides *PL*
- e) Bétaméthasone *BM*

- a) Urate *UNa*
- b) Pyrophosphate de calcium *PPC*
- c) Cholestérol *C*
- d) Phospholipides *PL*
- e) Bétaméthasone *BM*

3

- a) Urate *UNa*
- b) Pyrophosphate de calcium *PPC*
- c) Cholestérol *C*
- d) Phospholipides *PL*
- e) Bétaméthasone *BM*

4

- a) Urate *UNa*
- b) Pyrophosphate de calcium *PPC*
- c) Cholestérol *C*
- d) Phospholipides *PL*
- e) Bétaméthasone *BM*

Quel est votre diagnostic ?

Q2.

Patient de 26 ans,

Trisomie 21,

Chirurgie d'hallux valgus dans l'enfance,

Récidive des douleurs bilatérales

Bilan radiographique avant reprise chirurgicale

Q2.

Quel est votre diagnostic ?

Q3

- Femme de 36 ans
- Lésions des 4 et 5^{ème} doigts de la main droite

-

« Dactylite ? Rhumatisme ? »

Echographie du médus

D4 D PALMAIRE

D4 D PALMAIRE

IRM T2 FS

IRM T1

T2FS

Q3

Quel est votre diagnostic ?

Q4

**Patient de 67 ans,
Douleurs mécaniques chroniques de « hanche », des IPD
douleur du médus droit avec aspect de « dactylite »**

Antécédents :

- **IRC sur néphropathie à IgA** : Hémodialyse débutée en 1997. Hyperparathyroïdie secondaire (Mimpara)
- **Carcinome papillaire rénal** : Néphrectomie gauche élargie en 2007 et droite élargie en 2009, récurrence tumorale en 2013.
- **MGUS IgA-lambda** diagnostiquée en 2010.
- **Mélanome de l'arcade sourcilière** qui n'est plus suivi.
- **Psoriasis cutané.**

Q4

- Quel est votre diagnostic ?

Q5

Femme de 66 ans
tuméfaction achilléenne
globale

peu douloureuse

Q5

Quel est votre diagnostic échographique ?

Q5

Quel est votre diagnostic ?

1. Spondyloarthropathie
2. Tendinopathie calcanéenne fusiforme
3. Xanthomatose
4. Antécédent de peignage des tendons calcanéens
5. Sarcome à cellules claires

Q6

**Patiente, 52 ans,
Douleur des 2 chevilles évoluant depuis 1
mois**

PR sévère stabilisée sous adalimumab 40 mg/2 sem et
méthotrexate 25 mg/sem

Discret épanchement talo-crural
bilatéral

TC gauche

Ponction de 4 ml

TC droite

Q6

Diagnostic lésionnel ?

Etiologie ?

Q7

Patiente hospitalisée pour *lombalgie aiguë, douleurs chroniques des genoux*

Principaux antécédents :

- AIT en décembre 2015, absence de cause identifiée
- Notion d'entorses répétées du genou droit dans l'enfance.

Bandelette Urinaire aux urgences pour éliminer une pyélonéphrite :

- protéinurie significative.

Explorations complémentaires en néphrologie:

- protéinurie sur échantillon à 1,1 g/g, glomérulaire (92% d'albumine),
- fonction rénale normale.
- l'échographie rénale et des voies urinaires est sans anomalie.

Radiographies au niveau des articulations douloureuses (lombaires basses, et des deux genoux).

Q7

Quel est votre diagnostic radiologique ?

Q8

Suspicion d'arthrite aiguë du coude chez un homme de 54 ans

Antécédents :

- Rhumatisme psoriasique HLA B27 positif d'expression axiale et périphérique, traité de 2007 à 2011 par Méthotrexate, sans traitement de fond depuis. Psoriasis cutané traité par Daivobet.
- Carcinome thyroïdien en 2010, sigmoïdite diverticulaire.

Clinique :

- Douleur du membre supérieur gauche depuis 48 heures
 - Apparue le lendemain de la pratique du jet ski
- Œdème distal du bras gauche, effacement des reliefs musculaires du biceps brachial à sa partie distale.
- Pas d'épanchement articulaire au niveau du coude.
- Flessum 20°, pas de limitation de la flexion.
- Pas de déficit sensitivomoteur.
- Pas de fièvre.

Biologie :

- CRP < 1 mg/l
- NFS normale

RADIOGRAPHIES

ECHOGRAPHIE

Coupe
transversale

Muscle
biceps
brachial

Muscle
brachial

Humérus

Signes négatifs :

Pas de rupture
tendineuse bicipitale

Pas d'épanchement
intra-articulaire

Pas d'hématome
collecté

Coupe
longitudinale

M. biceps

M. brachial

Humérus

Q8

Quel est votre diagnostic ?

Q9

Patiente de 37 ans

Antécédents :

- **Personnels** : tendinopathies multiples, notion d'arthrose cervicale, chondropathie coxo-fémorale.
- **Familiaux** : SpA atypique chez le frère, HLA B27+.

Anamnèse:

- Depuis 4 ans :douleurs évoluant par poussées,
- intéressant l'hémi-bassin droit, récidivantes,
- associant fessalgies et douleurs inguinales droites.

Antalgique de palier 3 et anti-neuropathiques inefficaces.

Q9

Signes d'examen clinique:

- Hyperesthésie face externe de cuisse, haut de la fesse, face postérieure de cuisse et au niveau inguinal droit.
- Pas de déficit sensitif ou moteur.
- Lasègue homolatéral à 20°,
- Pas de raideur rachidienne.

Explorations para cliniques biologiques :

NFS normale,
Ionogramme normal,
EPP normale,
Absence de syndrome inflammatoire,
Pas d'hypercalcémie,
Bilan immunologique (AAN, CCP, FR) : négatif
HLAB27 positif.

CHU F

Droit couché

Q9

Quel est votre diagnostic?

- a. Sacro iliite rhumatismale
- b. Hernie discale
- c. Sacro-iliaque accessoire
- d. Ostéome ostéoïde
- e. Arthrite zygapophysaire

Q10