Un cas inhabituel de céphalées...

T. Grange¹, J. Girodon¹, J. Rauffet², F. Debiais¹

¹ Service de Rhumatologie CHU Poitiers

² Rhumatologue Cognac

Mme P.

- 24 ans
- Céphalées récentes prédominantes à l'effort
- Douleurs rachidiennes
- Avis devant aspect radiologique

Condensation osseuse diffuse

-
- Pas d'ATCD personnel, en particulier pas d'ATCD de fracture
 - ATCD familiaux : un frère et une sœur ayant une épilepsie

-
- Quelques acouphènes et flou visuel à l'effort
 - Douleurs rachidiennes, surtout cervicales spontanées et à la palpation
Pas de réveil nocturne
 - Douleurs à la palpation des os longs
 - Examen neurologique normal
 - Poids : 63 kgs Taille : 1m65

- Agrandissement progressif des mâchoires durant l'adolescence

Présence d'un torus palatinus

- Examens biologiques normaux :

NFS

Créatinine

Bilan phosphocalcique

Electrophorèse des protéines

Phosphatases alcalines osseuses, P1NP, ostéocalcine

CTX sérique

Pas de fluorose ni d'intoxication vit D

Sérologie Hépatites

Tryptase

LDH

- Scintigraphie osseuse normale

Examen ostéodensitométrique : Z-score > + 5 DS

Résumé des résultats DXA :

Région	Surface (cm ²)	CMO (g)	DMO (g/cm ²)	T - score	Z - score
L2	15.09	24.62	1.631		5.6
L3	17.96	27.25	1.517		4.4
L4	18.78	31.07	1.654		5.5
Total	51.83	82.94	1.600		5.4

CV TOTALE DMO 1.0%, ACF=1.036, BCF = 1.015, TH = 5.886

Résumé des résultats DXA :

Région	Surface (cm ²)	CMO (g)	DMO (g/cm ²)	T - score	Z - score
Col	4.92	8.00	1.628		6.5
Troch	11.28	16.23	1.439		7.0
Inter	18.01	33.76	1.875		5.1
Total	34.21	58.00	1.696		5.7
Ward	1.31	2.72	2.077		11.5

CV TOTALE DMO 1.0%, ACF=1.036, BCF = 1.015, TH = 5.974

▫ Radiographies

- Examen ophtalmologique :

Nodules cotonneux œil droit ; tortuosité vasculaire
Discret œdème papillaire

Quel est votre diagnostic ?

Ostéocondensation osseuse diffuse

- Rechercher une pathologie :
 - Iatrogène
fluorose, hypervitaminose D et A, bisphosphonate, intoxication métaux lourds
 - Maligne
lymphome, métastase osseuse secondaire prostate et sein, myélofibrose, myélome
 - Métabolique
ostéodystrophie rénale, ostéomalacie axiale, hépatite C, hypoparathyroïdie, Paget, ostéonécrose, mastocytose et ostéomyélite

Maladies ostéocondensantes héréditaires

- Avec un déficit de résorption osseuse :
 - Pourvoyeuse de fractures
 - Plus sévères dans les formes récessives
 - ostéopétrose infantile maligne
 - ostéopétrose type 2

Aspect « sandwich »
des vertèbres
Mutation inactivatrice du gène
CLCN7 (canal chlore 7)

Maladies ostéocondensantes héréditaires

- Avec une augmentation formation osseuse :
 - **Maladie de Camurati-Engelmann** : hyperostose os longs (épaississement corticales diaphyses) (*mutation gène $TGF-\beta 1$*)
 - **Maladie de Van Buchem, autosomique récessive** : agrandissement machoires (*mutation inactivatrice gène $SOST$*)
 - **Sclérostéose** : agrandissement des machoires, syndactylie, grande taille des patients (*mutation inactivatrice gène $SOST$*)
 - **L'hyperostose endostale type Worth, autosomique dominante** (*mutation activatrice gène $LRP5$*)

Diagnostic

- Sur arguments cliniques et radiographiques :
HYPEROSTOSE ENDOSTEALE type WORTH
avec signes d'HTIC débutante
- Confirmation génétique :
Mutation activatrice du gène LRP5

Hyperostose endostéale type Worth :

pathologie ostéocondensante héréditaire,benigne
autosomique dominante
très rare (décrit dans environ 10 familles)

- **Signes cliniques**

- métamorphose de la face à l'adolescence (front plat, mandibules allongées...)
- torus palatinus
- peu de complications neurologiques (HTIC, compression nerfs crâniens rare)
- pas de fracture

- **Radios**

- épaissement cortical et ostéocondensation du squelette axial.

-
- Augmentation de la masse osseuse
 - Mutation activatrice du gène LRP5 (« *Low density lipoprotein receptor-related protein 5* »)
 - Pas de traitement spécifique, traitement symptomatique des complications.

Gène *Irp5* localisé sur le bras long du chromosome 11

Rôle essentiel de la voie Wnt/béta-caténine dans le contrôle de la formation osseuse

Mutations de *LRP5* et *SOST* et densité minérale osseuse

Piters E et al. Arch Biochem Biophys 2008

Mutations inactivatrices du gène SOST

- Sclérostéose

Hyperostose ; masse osseuse élevée

Brunkow ME Am J Hum Genet 2001

Syndrome Ostéoporose-Pseudogliome :

Mutation de *Irp5* avec perte de fonction

Gong Y, Cell 2001

MERCI