

Pathologie étudiée	titre du protocole de Recherche	Promoteur	Phase	Description	Traitement à l'étude	Investigateur principal
Rhumatisme psoriasique	BI1311.5	Boehringer-Ingelheim	II	Etude d'efficacité et recherche de dose parmi 3 schémas de doses différents en administration sous-cutanée de BI 655066 chez des patients atteints d'un rhumatisme psoriasique	BI 655066 en SC	Dr DERNIS
spondylarthrite axiale	ComedSPA	AP-HP	NA	Comorbidités et éducation dans l'étude sur la spondylarthrite (COMEDSPA) Évaluation d'un suivi standardisé dans la spondylarthrite d'atteinte axiale.	Pas de traitement - étude de cohorte	Dr DERNIS
Polyarthrite Rhumatoïde	TOLEDO	PHRC AP-HP	III	Décroissance de l'abatacept ou du tocilizumab chez les patients en rémission de leur polyarthrite rhumatoïde : évaluation du risque de rechute et d'aggravation des lésions radiographiques et de l'impact économique d'une stratégie de décroissance	Maintien ou décroissance de l'Abatacept ou Tocilizumab	Dr DERNIS
Rhumatisme psoriasique	FUTURE 4	Montpellier	III	Etude évaluant l'efficacité, la sécurité d'emploi et la tolérance jusqu'à 2 ans du secukinumab (150mg) administré en seringue pré-remplie, avec ou sans dose de charge, chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique actif	secukinumab	Dr DERNIS
Vascularites associées aux ANCA	MAINRITSAN 2	APHP		Comparaison de 2 stratégies d'administration (séquentielle programmée vs "à la demande" du rituximab	rituximab	Dr DERNIS
Vascularites associées aux ANCA	MAINRITSAN 3	APHP		Comparaison de 2 stratégies d'administration (séquentielle programmée vs "à la demande" du rituximab	rituximab	Dr DERNIS
Rhumatisme inflammatoire chronique	INTENT			Immunogénicité chez les patients en échec d'anti-TNF.	Pas de traitement - prise de sang	Dr DERNIS
vascularites nécrosantes primitives	STATVAS	APHP		Évaluation de l'effet de la rosuvastatine sur les marqueurs d'athérosclérose infra-clinique au cours des vascularites nécrosantes primitives	Rosuvastatine	Dr DERNIS
Polyarthrite Rhumatoïde	GS-US-417-0301	Gilead	III	Évaluation de l'efficacité et la tolérance du Filgotinib associé à du méthotrexate chez des patients atteints de PR modérées ou sévères n'avant pas suffisamment répondu au méthotrexate.	Filgotinib	Dr DERNIS
Spondylarthrite ankylosante	SPACING	PHRC Montpellier	III/ RBM-PS	Effet de l'espacement des doses d'anti-TNF sur l'activité inflammatoire chez des spondylarthrites ankylosantes en faible activité inflammatoire.	Maintien ou décroissance de l'Enbrel, Humira, Cimzia, Simponi ou Rémicade (Anti TNFα)	Dr DERNIS